

Pooperační péče

Umístění zvířete

- Po operaci může přetrvávat u vašeho zvířete ospalost a neochota k pohybu po dobu asi 24 až 36 hodin. Po tuto dobu je potřeba umístit ho na klidné suché místo bez průvanu, s optimální teplotou prostředí okolo 20°C. Vždy je lepší mít zvíře trvale pod dohledem v místnosti, kde se budete pohybovat. Malá plemena je možno aktivně zahřívát (výchřevná podložka, PET láhev naplněná teplou vodou atd.)
- Nikdy nenechávejte zvíře na vyvýšeném místě - zamezíte tím pádu a případnému zranění

Voda

- Po příchodu domů nabídněte vašemu zvířeti malé množství čerstvé vody, ale jen pokud je zcela při vědomí. Vodu nabízejte i několikrát za hodinu
- Nenechte vaše zvíře vypít velké množství vody najednou, hrozí zvracení
- Neomezený přístup k vodě umožníte nejdříve až za 3 hodiny po prvním podání tekutin

Potrava

- Potravu nabídněte za 5-10 hodin po probuzení a to pouze za předpokladu, že vaše zvíře nezvrací a je dobře vzbuzené a orientované
- Podávejte pouze malé množství lehce stravitelné potravy
- U štěňat a velmi malých plemen psů začněte podávat potravu co nejdříve je to možné
- K normálnímu stravovacímu režimu přejděte cca za 24 hodin po operaci (pokud vám veterinář neurčí jinak)
- Potrava by měla být lehce stravitelná, bohatá na energii a aminokyseliny (např. vařená kuřecí prsa s rýží, komerční diety)

Pohybová aktivita

- Do vytažení stehů a krátce po vytažení je potřeba výrazně omezit pohyb vašeho zvířete
- Procházky musí probíhat pouze na vodítku, ovšem s vodítkem je potřeba zacházet jemně, spíše tahem než trháním
- Zamezte výskokům a stavění se na zadní nohy, u malých plemen chůzi do a ze schodů

Ochrana operační rány

- Zabraňte olizování operační rány - hrozí nebezpečí zavlečení infekce a předčasné odstranění stehů
- Použijte ochranné límce, ochranné bandáže nebo obleček. Je možné použít náhubek vypletený z přední strany prodyšným materiálem

Kontrola operační rány

- Mírný otok, bolestivost a zarudnutí je v prvních dvou až třech dnech normální
- Z rány nesmí vytékat žádná tělní tekutina nebo zánětlivý výpotek
- Po dobu hojení rány psa nekoupejte
- Stehy se obvykle vytahují za 10 až 12 dní, neurčí-li veterinář jinak

Tlumení bolesti

Nepodávejte žádné léky určené pro lidi typu Ibalgin, Ibuprofen, Acylpyrin, Paralen, Panadol, Dyclofenac a další. Vzniká tím nebezpečí vzniku žaludečních vředů, selhání ledvin, jater a krvácivých stavů

KDY KONTAKTOVAT VETERINÁŘE?

tel.: 776 766 093

- při prodlouženém probouzení (trvajícím déle než 12 hodin)
- pokud vaše zvíře znovu usne a nereaguje na běžné podněty
- při změně barvy sliznic - šedá, porcelánově bílá
- pokud se objevilo opakované zvracení
- pokud vaše zvíře odmítá vodu a krmivo déle jak 24 hodin, u štěňat a trpasličích plemen 12 hodin
- pokud je operační rána oteklá, červená, krvácí nebo prosakuje a mokvá
- při výskytu větší bolestivosti, nařikání a změn chování zvířete
- při jakýchkoliv dalších pochybnostech o zdravotním stavu vašeho zvířete konzultujte s ošetřujícím veterinářem